

ПАМЯТКА

владельцам животных по предотвращению распространения ящура

Ящур - вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и пузырьково-язвенными (афты) поражениями слизистой оболочки ротовой и носовой полости, кожи вымени и конечностей. Ящуром болеют животные любого возраста, однако легче заражается и более тяжело переболевает молодняк в возрасте до 2-3 месяцев. Заболеть ящуром могут и люди.

Возбудитель - фильтрующий вирус, сравнительно устойчивый к воздействию факторов внешней среды. Особенно благоприятными условиями для сохранения вируса во внешней среде являются низкая температура, повышенная влажность и нейтральная щелочная среда.

Источник возбудителя - больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни, а также переболевшие животные, которые длительное время могут быть вирусоносителями.

Пути заражения животных. В хозяйства возбудитель ящура заносится при поступлении больных или переболевших животных; при контактах с больными (переболевшими) животными, в том числе дикими; при пастьбе, водопое, перегонах через неблагополучные по ящурю территории; с инфицированными кормами и водой, а также при использовании молока от больных животных; при завозе продуктов убоя, полученных от больных (переболевших) животных; при использовании в корм необезвреженных кухонных отходов; с инфицированными (загрязненными) предметами ухода; одеждой и обувью ухаживающего персонала, транспортными средствами. Распространению инфекции может способствовать ветер, который разносит мелкие частицы корма, поражённой ткани, слюны, пыли и т.п., содержащие вирус ящура.

У человека заражение может возникнуть при работе с больным скотом, через контакт с сырьём животного происхождения (шерсть, шкуры), полученного от больных животных, при употреблении инфицированных мясомолочных продуктов, через инфицированные предметы ухода за животными, экскременты и т.д.

В группу риска входят люди, ухаживающие за скотом, работники боенских предприятий, ветеринарные специалисты, охотники.

Клинические признаки. Через слизистые оболочки и повреждённую кожу, вирус проникает в эпителий и начинает активно размножаться. При этом в межкопытной щели или во рту образуются первичные афты - не больше двух штук. На следующие сутки вирус с током крови разносится по всему организму. Из-за чего у животного наблюдается повышение температуры тела, угнетённое состояние, слюнотечение, отказ от корма, может развиваться диарея (понос). Во рту, в межкопытной щели, на венчике копыта и на коже сосков вымени образуется множество афт и эрозий, которые причиняют животному сильное беспокойство и вызывают хромоту. Поражение вымени сопровождается развитием мастита. У молодняка ящур сопровождается признаками гастроэнтерита или бронхопневмонии. Если вовремя не оказать помощь, то гибель взрослых животных может наступить через 5-14 суток, молодняка - через 1-2 суток.

В хозяйстве и на территории выпаса животных, где возникло заболевание ящуром, устанавливается карантин. По условиям карантина в эпизоотическом очаге все восприимчивые животные и продукты животноводства (мясо, молоко и т.д.) подлежат изъятию и уничтожению.

Всем владельцам животных необходимо соблюдать следующее:

Не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.

Предоставлять животных ветеринарным специалистам для проведения клинического осмотра и диагностических исследований.

Своевременно информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа животных и клинических признаках, характерных для ящура, также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание.

Немедленно изолировать животных, подозреваемых в заболевании, от основного стада, а также обеспечить изоляцию трупов павших животных.

Соблюдать меры личной гигиены.

Строго соблюдать рекомендации ветеринарных специалистов по содержанию скота, выполнению противозооотических и других мероприятий.

Помните! Невыполнение вышеуказанных требований может способствовать возникновению и распространению ящура как внутри хозяйства, так и у соседних хозяйств, нанести серьёзный экономический ущерб хозяйственной деятельности в условиях карантина, дополнительных затратах на проведение диагностических и оздоровительных мероприятий.

Заболевание несёт угрозу здоровья человека.

Информация об адресах и телефонах учреждений государственной ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа

ГБУ «Салехардский центр ветеринарии»

629003, г. Салехард, ул. Трудовая, д. 10.

Е-mail: salcv@sv.yanao.ru

Телефон: (34922) 4-63-21.

«Горячая линия»: +7-(922)-452-78-94.

ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии»

629300, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 10/1.

Е-mail: nurcv@sv.yanao.ru

Телефон: (3494) 24-15-10, 24-16-01. Факс: (3494) 24-15-10

«Горячая линия»: +7-(902)-824-03-49.

ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии»

629810, г. Ноябрьск, ул. Северная, д. 30.

Е-mail: noycv@sv.yanao.ru

Телефон: (3496) 42-82-27.

«Горячая линия»: 7-(922)-064-44-00.

Также информация об адресах и телефонах учреждений государственной ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа размещена на сайте - <https://sv.yanao.ru/about/suborg/>